

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ФЕЗАМ**

Регистрационный номер

Торговое название препарата: ФЕЗАМ

Международное (непатентованное) название препарата: нет

Химическое наименование: 2-охо 1-Pyrrolidineacetamide, , 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-properyl)- Piperazine

Лекарственная форма

Капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Пирацетам 400 мг

Циннаризин 25 мг

Вспомогательные вещества: Лактоза моногидрат, Коллоидальный диоксид кремния, Стеарат магния.

Фармакотерапевтическая группа: НООТРОПНОЕ СРЕДСТВО.

ИНДЕКС АТК: NO6B N 00

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с выраженным противогипоксическим эффектом. Оба компонента взаимно потенцируют собственное противогипоксическое и понижающее сопротивление сосудов мозга действие. Комбинированный препарат также способствует значительному повышению кровотока мозга. В отношении его воздействия на центральную нервную систему преобладает эффект седативного компонента циннаризина. Токсичность комбинации не превышает токсичности отдельных составляющих препарата.

Фармакокинетика.

Комбинированный препарат быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Терапевтический эффект проявляется через 1-6 часов.

Максимальный уровень циннаризина в плазме отмечают через 1-4 часа, пирацетама - через 2-6 часов. Метаболизм циннаризина протекает полностью, пирацетам выводится с мочой в неизменном виде примерно за 30 часов. 60%

циннаризина в неизмененном виде выводится с калом, остальное количество с мочой в виде метаболитов примерно за 5 часов. Максимальный уровень циннаризина через 1-4 часа отмечают не только в крови, а также в печени, почках, сердце, легких, селезенке и мозге. Связывается на 91% с протеинами плазмы. Распределение пираретама протекает быстро во всех важных органах.

Показания к применению

- нарушения мозгового кровообращения: при атеросклерозе сосудов мозга, ишемическом инсульте, периоде долечивания после геморрагического инсульта; после черепно-мозговых травм;
- нарушения памяти, мыслительной функции и концентрации внимания;
- нарушения настроения (при подавленности и раздражительности);
- энцефалопатии различного генеза;
- лабиринтопатии различного генеза: головокружение, шум в ушах, нистагм, тошнота и рвота; синдром Меньера;
- профилактика кинетозов;
- профилактика мигрени
- для улучшения обучения и памяти детей с отставанием интеллектуального развития.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, нарушения функции печени и/или почек, паркинсонизм, беременность, лактация.

Способ применения и дозы

Обычная доза для взрослых - 1-2 капсулы 3 раза в день в течение 1-3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения 2-3 раза в год.

Данная лекарственная форма назначается детям с 5 лет по 1-2 капсулы 1-2 раза в день.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном приеме возможно потенцирование седативного действия средств, угнетающих деятельность центральной нервной системы и алкоголя, а

также ноотропных и гипотензивных средств. Сосудорасширяющие средства усиливают действие препарата, а гипертензивные его уменьшают.

Побочное действие

Раздражительность, боли в эпигастрии, диспепсия, головная боль, сухость во рту, увеличение массы тела; очень редко светочувствительность, аллергические реакции в виде кожной сыпи, тремор конечностей, повышенный мышечный тонус.

Передозировка

Данных о передозировке препарата нет.

Предупреждения

Ввиду содержания циннаризина препарат может вызвать положительную реакцию у спортсменов при проведении допинг-теста. Также возможно изменение результатов определения радиоактивного йода (красители в оболочке капсулы содержат йод).

ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ

В терапевтических дозах (если основное заболевание позволяет) применение препарата допустимо при управлении транспортными средствами и работе с машинами и оборудованием.

Форма выпуска

Капсулы

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В оригинальных упаковках в закрытых, сухих складских помещениях при температуре не более 25°C, в местах, недоступных для детей.

Оберегать от прямого солнечного света!

Не хранить в помещениях повышенной влажности (как, например в ванных комнатах и т.д.).

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Не использовать после истечение срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

ОТПУСКАЮТ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА.

Производитель: Балканфарма-Дупница АД, Болгария, г.дупница 2600, ул Самоковское шоссе, 3. Тел: (+359701) 20921...9, Факс: (+359701) 22356, 28162.