

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по применению препарата **ИНДОМЕТАЦИН (Indometacin)**

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ИНДОМЕТАЦИН - INDOMETACIN

Международное (непатентованное) название (МНН): - INDOMETACIN

Лекарственная форма: 5% и 10% гель для наружного применения

Состав:

Активное вещество: Индометацина – 5% или 10%.

Вспомогательные вещества: макроголь 400, карбомер, пропиленгликоль, бензоат натрия, этиловый спирт.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное противовоспалительное средство. Код АТС С05СА54.

Фармакологическое действие

Индометацин оказывает противовоспалительное, обезболивающее, и противоотечное действие. При наружном применении устраняет боль, уменьшает отек и эритему, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, способствует увеличению объема движений.

Показания к применению

РЕВМАТОЛОГИЯ: ревматоидный полиартрит; острый, хронический, мышечный и суставной ревматизм; другие воспалительные заболевания суставов с дегенеративными изменениями; остеоартрит, остеоартроз, коксартроз, спондилоартроз; другие артрозы и артриты, бурсит, тендинит, тендовагинит, синовит, подагра; болезнь Бехтерева; острые воспалительные заболевания мягких тканей.

НЕВРОЛОГИЯ: боли в позвоночнике, невралгия, миалгия, дископатия, неврит, плексит, радикулит и т.д.;

ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ: травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата; послеоперационные отеки без нарушения целостности кожи.

АНГИОЛОГИЯ: поверхностные тромбофлебиты, лимфангиты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к индометацину и компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, нарушения свертываемости системы крови неясной этиологии, беременность и период кормления грудью, дети до 14 лет.

Предупреждения

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи. Избегать попадания геля в глаза, слизистые оболочки и открытые раны. При продолжительном лечении (более 10 дней) проверять картину крови (число лейкоцитов и тромбоцитов). В зависимости от комбинаций лекарства (с антибиотиками, антикоагулянтами, противодиабетическими средствами и пр.) осуществлять соответствующий клинический и лабораторный контроль.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с другими НПВС и у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, аллергическим «сенным» насморком, полипами слизистой носа.

Способ применения и дозы

НАРУЖНО!

Гель втирают тонким слоем в больные участки тела: 5%-ный 3-4 раза в сутки; 10%-ный 2-3 раза в сутки. Разовая доза для взрослых составляет 4 - 5 см выдавленного из тюбика геля, а для детей старше 14 лет - 2 - 2,5 см. Дневная доза не должна превышать 20 см 5 % геля или 15 см 10 % геля для взрослых и 10 см 5 % геля или 7,5 см 10 % геля для детей.

Побочные действия

При продолжительном применении возможны местные побочные эффекты: зуд, покраснение, сыпь.

Форма выпуска:

5% и 10% гель для наружного применения в тубах по 40 г.

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре 15-25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

2 года.

Не использовать препарат после даты, указанной на упаковке.

Отпуск из аптек

Без рецепта

Производитель

Балканфарма-Троян АД,

Болгария, г.Троян, ул. Крайречна 1.

Тел. (++ 359 701) 2-26-07

Факс (++ 359 701) 2-26-10

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для потребителей)

ИНДОМЕТАЦИН

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ИНДОМЕТАЦИН - INDOMETACIN

Международное (непатентованное) название (МНН): - INDOMETACIN

Лекарственная форма: гель

Состав:

40 г геля содержит:

Индометацина - 5% или

Индометацина – 10%

Вспомогательные вещества: макроголь 400, карбомер, пропиленгликоль, бензоат натрия, этиловый спирт.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное противовоспалительное средство. Код АТС С05СА54.

Показания к применению

Суставной синдром: суставной ревматизм, острый и хронический ревматоидный полиартрит, остеоартроз, другие артриты и артрозы, болезнь Бехтерева, подагра; боли в позвоночнике, невралгия, дископатия, неврит, плексит, радикулит; тромбоз, флебит, лимфангит; острые заболевания и травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата; псориатический артрит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к индометацину, аспирину или другим НПВС (нестероидным противовоспалительным средствам), язва желудка и

двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, нарушения свертываемости системы крови неясной этиологии, беременность и период кормления грудью.

Предупреждения

Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи. Избегать попадания геля в глаза, слизистые оболочки и открытые раны. При продолжительном лечении (более 10 дней) проверять картину крови (число лейкоцитов и тромбоцитов). В зависимости от комбинаций лекарства (с антибиотиками, антикоагулянтами, противодиабетическими средствами и пр.) осуществлять соответствующий клинический и лабораторный контроль.

Не следует применять препарат у детей до 14 лет без консультации врача.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с другими НПВС и у пациентов, страдающих бронхиальной астмой.

Способ применения и дозы

НАРУЖНО!

Гель втирают тонким слоем в больные участки тела: 5%-ный 3-4 раза в сутки; 10%-ный 2-3 раза в сутки. Разовая доза для взрослых составляет 4 - 5 сантиметров выдавленного из тюбика геля, а для детей - 2 - 2,5 сантиметра. Дневная доза не должна превышать 20 сантиметров 5 %-ного геля или 15 сантиметров 10 %-ного геля для взрослых и 10 сантиметров 5 %-ного геля или 7,5 сантиметров 10 %-ного геля для детей.

Побочное действие

При продолжительном применении возможны местные побочные эффекты: зуд, покраснение, сыпь.

Необходимо сообщать своему лечащему врачу о всех побочных (необычных) эффектах, в том числе, не указанных в листке-вкладыше!

Форма выпуска

Гель в тубах по 40 г, содержащий 5% или 10% индометацина.

Условия хранения

В сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре 15-25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 2 (два) года от даты выпуска.

Не использовать препарат после даты, указанной на упаковке.

Отпуск из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Название и адрес изготовителя

Балканфарма-Троян АД,

Болгария, г.Троян, ул. Крайречна 1.

Тел. (++ 359 701) 2-26-07

Факс (++ 359 701) 2-26-10