

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

### **ИНДОВАЗИН**

**(INDOVASIN)**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** ИНДОВАЗИН® (INDOVASIN®)

**Международное непатентованное название (МНН):** нет

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения

**Описание:** гель от желтого до желто-коричневого цвета с легкой опалесценцией.

#### **Состав**

*Активные вещества:* индометацин 3 %, троксерутин 2 %

*Вспомогательные вещества:* карбомер, макроголь, натрия бензоат, пропиленгликоль, этиловый спирт.

**Фармакологическая группа:** Противовоспалительное средство для местного применения.

**Код АТХ** M02AA23.

#### **Фармакологическое действие**

Индовазин – комбинированный препарат для наружного применения, в состав которого входят индометацин и троксерутин. Индометацин, который является нестероидным противовоспалительным препаратом, оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие. Троксевазин относится к ангиопротекторным средствам, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

#### **Показания к применению**

Мышечно-суставные заболевания (бурсит, тендовагинит, синовит и т.д.); варикозное расширение вен, сопровождаемое болями и отеками; трофические нарушения при хронической венозной недостаточности; гематомы травматического происхождения.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, нарушения свертывающей системы крови неясной этиологии. Беременность и период грудного вскармливания, дети в возрасте до 14 лет.

Не следует применять препарат у больных, страдающих бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, полипами слизистой носа.

### **Способ применения и дозы**

НАРУЖНО! 1 - 2 см геля наносят легкими втирающими движениями на пораженные участки 2 - 3 раза в сутки.

Курс лечения не должен превышать 10 дней без консультации врача.

### **Побочное действие**

Редко наблюдаются аллергические реакции в виде сыпи, покраснения кожи, крапивницы, зуда. При возникновении аллергических реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

При нанесении на обширные участки продолжительное время могут проявиться системные побочные эффекты:

Со стороны пищеварительной системы: НПВП-гастропатия, абдоминальные боли, тошнота, рвота, изжога, анорексия, диарея, нарушение функции печени (повышение в крови билирубина, «печеночных» трансаминаз). При длительном применении в больших дозах – изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница, возбуждение, раздражительность, усталость, сонливость, депрессия, периферическая нейропатия.

Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах, нарушение вкуса, диплопия, нечеткость зрения, помутнение роговицы, конъюнктивит.

Со стороны ССС: сердечная недостаточность, тахикардия, повышение артериального давления.

Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, протеинурия, гематурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, некроз сосочков.

Со стороны системы гемостаза: кровотечение (желудочно-кишечное, десневое, маточное, геморроидальное), тромбоцитопения.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, бронхоспазм; редко – синдром Лайелла, узловатая эритема, анафилактический шок.

Лабораторные показатели: агранулоцитоз, лейкопения, гипергликемия, глюкозурия, гиперкалиемию.

Прочие: асептический менингит (чаще у пациентов с аутоиммунными заболеваниями), апластическая анемия, аутоиммунная гемолитическая анемия, отечный синдром, усиление потоотделения.

**Особые указания**

Препарат предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны.

Не следует применять препарат с другими НПВС.

**Форма выпуска**

Алюминиевая туба, содержащая 45 г препарата в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения**

В сухом месте, недоступном для детей при температуре не выше 25 °С.

**Срок годности**

2 года

Не использовать препарат после даты, указанной на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Название и адрес изготовителя**

Балканфарма-Троян АД,

Болгария, г.Троян, ул. Крайречна 1.

Тел. (++ 359 670) 2-26-07

Факс (++ 359 670) 2-26-10