

Инструкция по применению препарата

Бисакодил

Bisacodyl

Слабительное средство

5 мг, таблетки
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П №013214/01-2001

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: БИСАКОДИЛ (BISACODYL)

МЕЖДУНАРОДНОЕ (НЕПАТЕНТОВАННОЕ) НАЗВАНИЕ (МНН): Бисакодил

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой по 5 мг.

СОСТАВ: 1 таблетка содержит 5 мг Бисакодила.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Слабительное средство [A06AB02].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Бисакодил увеличивает секрецию слизи в толстом кишечнике, ускоряет и увеличивает его перистальтику. Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстого кишечника. При приеме внутрь всасывается из кишечника в минимальном количестве. Слабительное действие наступает обычно через 6 часов, при приеме перед сном через 8-12 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки, в частности после операций, родов, диетическом режиме питания, в пожилом возрасте. Применяется также при предоперационной подготовке и подготовке толстой кишки к рентгенологическому и эндоскопическому обследованию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Принимают внутрь вечером перед сном, начиная с одной таблетки. При отсутствии эффекта однократную дозу увеличивают до 2-3 таблеток. Детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке вечером.

При подготовке к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям назначают по 2 таблетки на ночь за сутки и по 2 таблетки на ночь накануне операции или исследования.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Тошнота, боли в животе, вздутие, ощущение тяжести, в редких случаях слизь и кровь во время и после стула. Длительное применение бисакодила в больших дозах может привести к чрезмерным потерям воды и электролитов, что, в свою очередь, может привести к мышечной слабости, нарушениям сердечной деятельности, возникновению судорог, артериальной гипотензии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, боли в животе неясного генеза, кровотечения из ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор, острый геморрой, острый проктит, нарушения водно-электролитного баланса.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ: При одновременном длительном применении бисакодила в больших дозах с сердечными гликозидами их действие может усилиться вследствие гипокалиемии.

Одновременный прием бисакодила с мочегонными средствами и глюкокортикоидами может вызвать усиление гипокалиемии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: С осторожностью применяют бисакодил у беременных и кормящих женщин, а также у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Бисакодил в таблетках не применяется у детей в возрасте до 6 лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в кишечнике по 5 мг, по 30 штук в упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В сухом и защищенном от света месте при температуре 15-25°C.

ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД, 2600 Дупница, Болгария.