

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по применению препарата **КЛЕНБУТЕРОЛ (Clenbuterol)**

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Кленбутерол - Clenbuterol

Международное (непатентованное) название (МНН): Clenbuterol

Химическое название: 4-амино-3,5-дихлор- α -[[1,1-диметилэтил]амино]метил]бензен метанол гидрохлорид

Лекарственная форма: Сироп

Состав:

1 мл сиропа содержит: 0,001 мг (0,000001 г) кленбутерола гидрохлорида;

1 дозировочная ложка (5 мл) содержит: 0,000005 г кленбутерола гидрохлорида.

Вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, пропиленгликоль, натрия цитрат, лимонная кислота, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, бутилпарагидроксибензоат, натрия бензоат, эссенция "лесная малина", дистиллированная вода.

Описание

Кленбутерол представляет собой прозрачную, бесцветную, слегка вязкую жидкость со сладким вкусом и характерным запахом лесной малины.

Фармакотерапевтическая группа

Бронхолитические средства, β_2 -адреномиметики. Код АТС - R03CC.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика Препарат обладает продолжительным и выраженным бронхолитическим действием в результате воздействия на β_2 -адренорецепторы бронхов. Кленбутерол купирует и предупреждает бронхоспазм. Улучшает мукоцилиарный клиренс. Оказывает токолитическое действие: понижает тонус и сократительную активность миометрия.

Фармакокинетика Препарат характеризуется высокой активностью, быстрым и полным всасыванием при приеме внутрь. Высокие концентрации в плазме создаются через 15 минут после разового приема и наблюдаются в течение 7 - 24 часов, поэтому в сравнении с другими симпатомиметиками препарат

назначают в значительно меньших дозах и применяют для длительного лечения бронхиальной астмы и обструктивного бронхита, в том числе и у детей. Выводится преимущественно через почки (приблизительно 80 %).

Показания к применению

Бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких и другие бронхолегочные заболевания с бронхообструктивным синдромом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к кленбутеролу, первый триместр беременности и непосредственно перед родами, тиреотоксикоз, острый период инфаркта миокарда.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Детям до 8 месяцев при весе тела 4-8 кг назначают 2 раза в день по 2,5 мл; детям 8-24 месяцев (вес тела 8-12 кг) - 2 раза по 5 мл; детям 2-4 лет (вес тела 12-16 кг) - 2 раза по 7,5 мл; детям 4-6 лет (вес тела 16-22 кг) - 2 раза по 10 мл; детям 6-12 лет (вес тела 22-35 кг) - 2 раза по 15 мл.

Детям старше 12 лет и взрослым - 2-3 раза в день по 15 мл; поддерживающая доза - 2 раза в день по 10 мл.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Бета-адреноблокаторы являются антагонистами кленбутерола и могут устранять действие препарата. При одновременном применении с сердечными гликозидами кленбутерол нарушает сердечный ритм и увеличивает их токсичность. Нарушения ритма наблюдаются и при комбинированной терапии с ингибиторами МАО и теофиллином. Кленбутерол уменьшает действие инсулина и сахароснижающих препаратов - производных сульфанилмочевины. В комбинации с симпатомиметическими средствами усиливается токсичность препарата.

Побочное действие

Тахикардия, экстрасистолия, головная боль, аллергические реакции в виде кожной сыпи. Возможна сухость во рту, тошнота, снижение артериального давления. В отдельных случаях в начале может появиться тремор рук или слабо выраженное чувство беспокойства, которые требуют

снижения дозы.

Передозировка

Согласно классификации Hodge и Sterner при применении внутрь кленбутерол относится к среднетоксическим веществам. При передозировке препаратом может наблюдаться легкий тремор конечностей, беспокойство и тахикардия, которые проходят после уменьшения дозы.

Форма выпуска

Сироп во флаконах по 100 мл.

Условия хранения

В оригинальных упаковках, в закрытых складских помещениях, в защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от 15 до 30°C.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Срок годности

3 года от даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

Название и адрес изготовителя

Балканфарма-Троян АД,

Болгария, г.Троян, ул. Крайречна 1.

Тел. (++ 359 701) 2-26-07

Факс (++ 359 701) 2-26-10