

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

# **Бенальгин**

**НПВП + психостимулирующее средство + витамин**

**таблетки**

**Регистрационный номер:** П № 012776/01 от 09.12.2003

**Торговое (патентованное) название:** БЕНАЛЬГИН

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав:**

1 таблетка содержит:

**Активные вещества:** метамизола натрия 500 мг, кофеина 50 мг, тиамин гидрохлорида 38,75 мг.

**Вспомогательные вещества:** желатин, крахмал пшеничный, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат.

**Описание:** таблетки круглые, плоские, белого цвета, с разделительной чертой на одной стороне.

**Фармакологическая группа:** средство для устранения симптомов ОРЗ и “простуды” (НПВП + психостимулирующее средство + витамин).

**Код АТХ:** N02BB72

**Фармакологическое действие:** Комбинированный препарат, оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

**Метамизол** оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

**Кофеин** оказывает противомигренозное (тонизирует сосуды мозга) и психостимулирующее действие.

**Тиамин гидрохлорид** (витамин В 1) участвует в обмене веществ и способствует улучшению нервно-рефлекторной регуляции.

**Показания к применению:** Умеренно или слабо выраженный болевой синдром (головная, зубная, мигренозная боль, невралгия, миалгия, боли в суставах, корешковый синдром, альгодисменорея, почечная, желчная и кишечная колика). Повышенная температура тела при “простудных” и других инфекционно воспалительных заболеваниях (при установленном диагнозе).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к другим производным пиразолона - бутадииону, трибузону; тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность; бронхоспазм; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Заболевания системы крови (лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия); угнетение костномозгового кроветворения; бессонница.

Неконтролируемая артериальная гипертензия; выраженный атеросклероз; повышение внутриглазного давления; период беременности и грудного вскармливания; детский возраст (до 12 лет).

*С осторожностью* – при начальной стадии печеночной и/или почечной недостаточности.

**Способ применения и дозы:**

Внутри после еды по 1 таблетке 2-3 раза в первой половине дня. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таблетки, суточная – 6 таблеток не более 1-2 дней.

**Дозировки для детей** - детям в возрасте от 12 до 16 лет - по половине или одной таблетке 2-3 раза в день, максимальная суточная доза - 4 таблетки.

**Продолжительность приема** - не более 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и 3-х дней в качестве жаропонижающего средства.

*Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.*

**Побочное действие:** Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, отек Квинке, анафилактический шок); бронхоспазм. При длительном приеме – нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз).

Возможны нарушения сна, сердцебиение, нарушения ритма сердца.

*О всех побочных эффектах следует сообщать лечащему врачу.*

**Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, рвота, боли в эпигастрии, психическое и двигательное возбуждение, тахикардия, нарушения ритма сердца, возможно уменьшение диуреза, эпилептиформные судороги.

*Лечение:* следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты. При необходимости проводят симптоматическое лечение.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременное применение метамизола натрия с другими ненаркотическими анальгетиками, нестероидными противовоспалительными средствами может привести к взаимному усилению токсических эффектов.

Трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивные средства, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола натрия в печени и повышают его токсичность.

Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола натрия. Одновременное применение метамизола натрия с циклоспорином снижает уровень последнего в крови. Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие метамизола натрия.

**Особые указания:**

Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (чай, кофе) на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки.

С осторожностью и под врачебным контролем применяют у больных с нарушенной функцией печени или почек.

Одновременное применение препарата с алкогольсодержащими напитками не рекомендуется.

Может изменять результаты анализов допинг-контроля спортсменов. У больных, страдающих атопической бронхиальной астмой, поллинозами, имеется повышенный риск развития реакций гиперчувствительности.

При приеме Бенальгина необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

10 таблеток в блистер из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги.

1 или 2 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачке.

**Условия хранения:** В защищенном от света сухом месте, при температуре 15-25 °С.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!**

**Срок годности:** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** По рецепту.

**Производитель:** Балканфарма-Дупница АД, ул. Самоковское шоссе 3, 2600 Дупница, Болгария. Тел.: (+359 701) 58 196, факс: (+359 701) 58 555.