

# Almagel®

Antacid

# Алмагель®

Суспензия

**Регистрационный номер:** П № 012742/01-2001 от 02.03.2001

**Торговое (патентованное) название препарата:**

АЛМАГЕЛЬ® (ALMAGEL®)

**Международное (непатентованное) название (МНН):** нет

**Лекарственная форма:** суспензия.

**Состав:**

**Активные вещества:** окись алюминия 4 %, окись магния 1,38%.

**Вспомогательные вещества:** сорбит, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, бутилпарагидроксибензоат, этиловый спирт (1,8%), сахарин натрий, лимонное масло, гидроксиэтилцеллюлоза, очищенная вода.

**Описание:** Алмагель® представляет собой суспензию белого или слегка сероватого цвета с характерным сладковатым вкусом и свежим характерным запахом лимона. При хранении, особенно при низких температурах, на поверхности выделяется слой прозрачной жидкости. При энергичном взбалтывании флакона гомогенность суспензии восстанавливается. Смешивается с водой и спиртом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антацидное средство.  
АТС: A02AX.

**Фармакологические свойства:** Алмагель® нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, что приводит к уменьшению переваривающей активности желудочного сока. Не вызывает вторичной гиперсекреции желудочного сока. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшает влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку. Терапевтический эффект после приема препарата наступает через 3-5 минут и продолжается в среднем 70 минут.

**Показания к применению:** язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; острый гастрит, хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения;

дуоденит, энтерит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит; функциональные расстройства кишечника, колит; дискомфорт и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после употребления кофе, никотина, алкоголя; профилактически при лечении глюкокортикостероидами и нестероидными противовоспалительными препаратами.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженное нарушение функции почек, болезнь Альцгеймера, ранний детский возраст (до 1 месяца).

**Способ применения и дозы:** ВНУТРЬ! По назначению врача, по 1-3 дозировочные (чайные) ложки, в зависимости от остроты случая, 3-4 раза в сутки за полчаса до еды и вечером перед сном. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и некоторых формах язвенной болезни желудка (язва антрального отдела) можно принимать **Алмагель®** между основными приемами пищи. При достижении оптимального терапевтического эффекта рекомендуется поддерживающее лечение: по 1 дозировочной ложке 3-4 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. Профилактически **Алмагель®** принимают в дозе 1-2 чайные ложки.

**У детей препарат применяется строго по назначению врача:**

**В** детям до 10 лет назначают по 1/3 дозы для взрослых, а

**В** детям с 10 до 15 лет - по 1/2 дозы для взрослых.

При заболевании, сопровождающемся тошнотой, рвотой и болями в животе, лечение начинают с **Алмагеля А**, а по исчезновении перечисленных симптомов переходят на прием **Алмагеля**.

**Предупреждения:**

**В** интервал между приемом **Альмагеля** и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа.

**В**не рекомендуется принимать препарат в дозах, превышающих 16 ложек в сутки, или, если применяют такую дозу, продолжительность курса лечения должна составлять не более 2 недель.

**В**при длительном приеме препарата следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора.

**В**перед приемом флакон следует взбалтывать!

**Беременность и лактация:** Не рекомендуется назначать **Алмагель®** дольше 3 дней при беременности. Избегать назначения кормящим матерям.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** При одновременном применении **Алмагель®** может уменьшить терапевтический эффект антибиотиков тетрациклинового ряда, блокаторов гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов, гликозидов наперстянки, солей железа, ципрофлоксацина, фенотиазинов, изониазида, бетаадреноблокаторов, индо-метацина и кетоконазола.

**Побочное действие:** В отдельных случаях при приеме препарата могут возникать изменение вкусовых ощущений, тошнота, рвота, спазм желудка, боли в эпигастральной области и запор, которые проходят после уменьшения дозы. При применении высоких доз может вызвать сонливость. Продолжительное лечение с применением высоких доз препарата и бедной фосфором еды может привести у предрасположенных пациентов к развитию дефицита фосфора в организме, повышенной резорбции и экскреции кальция с мочой и возникновению остеомаляции. Поэтому при длительном приеме препарата следует обеспечить достаточное поступление с пищей фосфора. У больных хронической недостаточностью почек, кроме остеомаляции, могут наблюдаться отеки конечностей, деменция и гипермагниемия.

**Форма выпуска:** суспензия в стеклянных флаконах по 170 мл с дозирующей ложкой; суспензия в пластиковых флаконах по 170 мл с дозирующей ложкой.

**Условия хранения:** в сухом и защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

**Не допускать замерзания!**

**Срок годности:** 5 лет с даты производства.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Название и адрес изготовителя:**

Балканфарма Троян АД, Болгария,  
5600 гр. Троян, ул. Крайречна 1  
Тел.: (+359 670) 2 26 07  
Факс: (+359 670) 2 26 10

*Инструкция одобрена Фармакологическим комитетом Минздрава России от 30 ноября 2000 г., протокол № 6*

