

Инструкция по медицинскому применению препарата

Индометацин 10%

Indometacin 10%

40 г мазь

Регистрационный номер: П № 012767/01-2001 от 13.03.2001

Международное непатентованное название (МНН): Индометацин.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав: Индометацин - 10%, диметилсульфоксид, холестерол, стеариловый спирт, белый воск, ланолин, вазелин.

Описание: Препарат представляет собой гомогенную мазь желтого или коричневого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС). Код АТС – М02АА.

Фармакологическое действие: Индометацин оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие.

При наружном применении устраняет боль, уменьшает отек и эритему, способствует уменьшению утренней скованности и припухлости суставов, способствует увеличению объема движений.

Показания к применению:

Ревматология: ревматоидный полиартрит; острый, хронический, мышечный и суставной ревматизм; другие воспалительные заболевания суставов с дегенеративными изменениями; остеоартрит, остеоартроз, коксартроз, спондилоартроз, другие артрозы и артриты, бурсит, тендинит, тендовагинит, синовит, подагра; болезнь Бехтерева; воспалительные острые заболевания мягких тканей.

Неврология: боли в позвоночнике, невралгия, миалгия, дископатия, неврит, плексит, радикулит и т.д.

Хирургия и травматология: травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, послеопера-ционные отеки без нарушения целостности кожи.

Ангиология: поверхностные тромбофлебиты, лимфангиты.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к индометацину и компонентам препарата, аспирину или другим НПВС; язва желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, нарушения свертываемости крови неясной этиологии, беременность и период кормления грудью, дети до 14 лет.

Предупреждения: Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи. Избегать попадания мази на открытые раны, в глаза и другие

слизистые оболочки. При продолжительном лечении (более 10 дней) проверять картину крови (число лейкоцитов и тромбоцитов). В зависимости от комбинации лекарства (с антибиотиками, антикоагулянтами, противодиабетическими средствами и пр.) осуществлять соответствующий клинический и лабораторный контроль.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с другими НПВС и у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, аллергическим “сенным” насморком, полипами слизистой носа.

Способ применения и дозы: НАРУЖНО!

Мазь втирают тонким слоем в кожу болезненных участков тела 2-3 раза в сутки. Общее количество в день не должно превышать 15 см мази для взрослых и 7,5 см - для детей старше 14 лет.

Побочные действия: При продолжительном применении возможны местные побочные эффекты: зуд, покраснение, сыпь.

Необходимо сообщать своему лечащему врачу о всех побочных (необычных) эффектах, в том числе, не указанных в инструкции!

Форма выпуска: Мазь для наружного применения в тубиках по 40 г.

Условия хранения: В защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре 15 - 30оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Отпуск из аптек: Отпускается по рецепту врача.

Производитель: Балканфарма-Троян АД
Болгария, г. Троян, ул. Крайречна, 1
Тел.: (++359 670) 2 26 07;
Факс: (++ 359 670) 2 26 10

Инструкция одобрена Фармакологическим комитетом

Минздрава России от 14 декабря 2000 г., протокол № 76