

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ТРОКСЕВАЗИН® (TROXEVASIN®)

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ТРОКСЕВАЗИН®

Международное непатентованное название (МНН) - Троксерутин

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Описание: Гель от желтого до светло-коричневого цвета.

Состав: Троксерутин – 2%, карбомер, ЭДТА динатрия, бензалкония хлорид, триэтаноламин, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторное средство.

Код АТХ С05СА04.

Фармакологическое действие: Троксевазин® представляет собой флавоноид (производное рутина), обладает Р-витаминной активностью; оказывает вентонизирующее, ангиопротекторное, противотечное, антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует гиалуронидазу, стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек и уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус.

Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови.

Снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов.

Фармакокинетика.

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

Показания к применению

Боли и отеки, связанные с хронической венозной недостаточностью; чувство тяжести и боли в ногах, отечность лодыжек; усталость, припухлость, судороги, парестезии, острый поверхностный тромбофлебит и перифлебит, варикозный дерматит; боли и отеки травматического характера (в т.ч. при повреждениях связок, растяжениях или ушибах мышц).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Нарушение целостности кожных покровов.

Способ применения и дозы

Наружно!

Гель наносят на область поражения 2 раза в сутки утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии Троксевазина отсутствуют.

Особые указания

Гель наносят только на неповрежденную поверхность.

Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки!

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Нетоксичен, имеет большую широту терапевтического действия.

Побочное действие

В редких случаях наблюдаются аллергические кожные реакции - крапивница, экзема, дерматит.

Упаковка

По 40 г в алюминиевую тубу с внутренним лаковым покрытием. Одна туба с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах недоступных для детей!

Не допускать замораживания!

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечению срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес изготовителя

Балканфарма-Троян АД,

Болгария, г.Троян, ул. Крайречна 1.